

| 便中ヘリコバクターピロリ抗原検査 4400円 |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的                     | 現在ヘリコバクターピロリ菌に感染しているかを調べることができます。尿素呼気試験と同様に感度、特異度ともに高い検査です。除菌後の判定もできる検査です。                                |
| 検査方法                   | 検便                                                                                                        |
| ご注意                    | プロトンポンプ阻害剤（PPI）という胃酸分泌を押さえる薬や抗生剤を検査1ヶ月以内に内服された方は、偽陰性となることがあるため、検査はおすすめできません。ピロリ菌除菌直後の場合は正確な判定がでない場合があります。 |


| 視野検査 2200円 |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 目的         | 片眼約40秒のスクリーニング検査です。失明の原因として、もっとも多い緑内障による視野の異常や欠損を、早い段階で捉えます。 |
| 検査方法       | 額を器械に付けて、眼は動かさずに、動いている「白と黒の縞」がわかったら、ボタンを押す検査です。              |
| ご注意        | 眼科で視野検査を定期的に受けている方は、眼科での検査をお勧めします。                           |

| ホルター心電図 16500円 |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的             | 24時間の心電図を端末に記録して、不整脈や心筋虚血の有無を調べます。                                                                            |
| 検査方法           | 携帯型の心電計装着し、日常生活中に長時間の心電図を記録してこれを解析し、観察していきます。検査中に何らかの症状が出現した時には、装置のボタンを押していただき、解析の際に時間や症状が記録された心電図とともに分析されます。 |
| ご注意            | 医療機器を装着するため、検査中はご入浴はできません。次の日に返却をお願いします。                                                                      |



| 睡眠時無呼吸症候群検査 8800円 |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的                | 睡眠時に携帯型の計測装置を取り付けてお休みいただくだけの自宅で行える検査で、睡眠中の呼吸状態、イビキ、血中酸素濃度などのデータをもとに睡眠時呼吸障害（無呼吸など）の有無を判定します。 |
| 検査方法              | ご自宅で寝る前に装置を取り付けていただきます。                                                                     |

| 内臓脂肪CT 3300円 |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 目的           | 内臓脂肪型肥満は生活習慣病の危険が高まります。<br>腹囲の測定では推測のため、正確に皮下脂肪と内臓脂肪を測定します。 |
| 検査方法         | X線CT装置にてへその高さの断面を撮影します。                                     |
| ご注意          | 妊娠中、またはその可能性がある方は検査できません。                                   |




<内臓脂肪CT画像>

| 骨粗しょう症検査 超音波骨密度測定（踵部）検査 1100円 |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| 目的                            | 骨密度を測り、骨粗しょう症になっていないかを調べる検査です。         |
| 検査方法                          | 超音波をあてて骨密度を測ります。数分間で検査は終了し、結果もすぐわかります。 |



健康な骨  
(密度が高く、丈夫)



骨粗鬆症の骨  
(内部がスカスカでもろい)



| 動脈硬化検査 頸部動脈超音波 6050円                 |                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 心臓ドック・脳ドックを受けていただいた方のオプションとさせていただきます |                                                                                                                     |
| 目的                                   | 超音波で簡便に視覚的に動脈硬化の診断が出来る検査です。頸動脈の状態から全身の動脈硬化の進行具合を推定することができます。                                                        |
| 検査方法                                 | 首にゼリーをぬり、プローブと呼ばれる小さな器械を当てて検査します。痛みもなく15分ほどの検査で、血管の膜の厚み、狭さやコレステロールがたまってできる、かゆ状の隆起・粥腫の状態を調べる簡単な検査で、リラックスして受けていただけます。 |
| ご注意                                  | ネックレスやタートルネックは外して頂きます。                                                                                              |

# 血液検査オプション

\* 費用は税込みです。

| 関節リウマチ検査 抗CCP抗体 4400円 |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的                    | 抗CCP 抗体は、関節リウマチの早期診断に有用な検査です。高値の人は関節リウマチである、もしくは後々関節リウマチになる可能性が90%以上と高く、ほかの関節炎では陽性になる可能性が低いとされています。 |

| 胃がんリスク検診 ABC検査 4400円 |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的                   | 血清ピロリ菌抗体価測定とペプシノゲン法による胃粘膜萎縮の程度を測定し、その結果を組み合わせることで胃の健康度を分類します。                           |
| ご注意                  | ピロリ菌除菌後の方、胃の手術を受けた方、食道・胃・十二指腸疾患で治療中の方、腎機能が低下している方、胃酸を抑える薬・免疫抑制剤・ステロイドを内服している方は検査の対象外です。 |

| 抗体価検査 1抗体 2750円 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 目的              | 麻疹、風疹、水痘、耳下腺炎の抗体価を調べる検査です。ワクチンを接種していても現在十分な抗体があるのか気になる方におすすめです。 |

| 心不全マーカー NT-proBNP 2090円 |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的                      | 心臓から分泌されるホルモンN t p r oBNPの値を測定し、心不全の程度を検査します。特に、高血圧・糖尿病の方は自覚症状の少ない、心不全早期からの病態を発見するためにお勧めです。 |

| アレルギー検査MAST48 19030円 |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的                   | 血液中の血清を用いてアレルギーの原因となる物質、特異的I g Eを測定します。一度に48項目も調べられるのでご本人も気づかなかったアレルギーの原因が見つかることもあります。 |

| 糖負荷試験（75g経口ブドウ糖負荷試験） 2475円 |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的                         | 糖尿病の疑いのある方に、糖尿病診断の判断材料の一つとして行われる検査です。空腹時の血糖値とともに、75gブドウ糖水溶液を飲み、飲む前と飲んだ後に、血糖値がどのように変化するかをみて判定をします。 |
| 検査方法                       | 空腹時採血、75g経口ブドウ糖負荷後30分、60分、120分後の採血                                                                |
| ご注意                        | 当日は絶飲食となります。検査中は食事、運動、喫煙はできません。胃検査を受ける方は別日程での検査となります。                                             |

| 赤血球沈降速度検査（血沈） 770円 |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的                 | 赤血球が試験管の中を沈んでいく速度を測定します。体の中で炎症を中心とした病気の把握につながりますが、この検査だけではなく、CRP検査や白血球数検査とともに総合的に判断されます。 |

| 甲状腺ホルモン（FT3、FT4、TSH） 4620円 |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 目的                         | 甲状腺の機能状態を知ることができる検査です。 |

# 血液検査オプション（腫瘍マーカー）

\*費用は税込みです。

| CA125 2200円 |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 目的          | 婦人科系のがんを見つける腫瘍マーカー検査です。子宮内膜症や子宮筋腫で数値が上がることもあります。女性にお勧めの検査です。 |

| PSA 1980円 |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 目的        | PSAは血液検査で前立腺がんを見つける腫瘍マーカー検査です。前立腺肥大症や前立腺炎でも高値になることがあります。 |

| 消化器がん腫瘍マーカーセット （3種類） 4950円                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CEA 1,760円                                                                                                   |  |
| CEAは胎児の消化器細胞だけにある蛋白の一種ですが、がんが増殖している組織内でも作られます。主に、大腸・胃・肺・膵臓がんを見つける腫瘍マーカー検査です。喫煙でも数値が上がるときがあります。検査前は禁煙をお勧めします。 |  |
| CA19-9 1,980円                                                                                                |  |
| CA19-9は膵臓、胆のう癌などを腫瘍マーカーで見つける検査です。胆石や膵炎、婦人科系疾患でも数値が上がることがあります。高値だった場合は、より詳しい精密検査を行う必要があります。                   |  |
| AFP 1,760円                                                                                                   |  |
| AFPは胎児の血清中に見られる蛋白の一種で肝臓がんになると増加します。肝臓がんのふるいわけとして有効な腫瘍マーカー検査です。肝臓は沈黙の臓器で肝がんも初期には症状がほとんどありません。早期発見が重要です。       |  |

| 肺がん腫瘍マーカーセット （4種類） 7700円                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| シフラ 21-1 2,420円                                                                                                   |  |
| シフラ21-1は肺がん（扁平上皮がん）を見つける腫瘍マーカーです。がんの有無だけでなく肺の良性疾患と区別しやすい点も大きなメリットです。男性のがんの死亡原因1位は肺がんです。女性も3位です。早期発見が重要です。         |  |
| CEA 1,760円                                                                                                        |  |
| CEAは胎児の消化器細胞だけにある蛋白の一種ですが、がんが増殖している組織内でも作られます。主に、大腸・胃・肺（腺がん）・膵臓がんを見つける腫瘍マーカー検査です。喫煙でも数値が上がるときがあります。検査前は禁煙をお勧めします。 |  |
| SCC 1,760円                                                                                                        |  |
| 肺がん、子宮頸がん、食道がんなどの扁平上皮がんの腫瘍マーカーです。他に尿路、皮膚、性器（女性）に出来るがんでも値が上昇します。                                                   |  |
| ProGRP 2,530円                                                                                                     |  |
| 肺がん（肺小細胞がん）の腫瘍マーカーです。                                                                                             |  |

| すこやかに歩む女性更年期検査 5500円 |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 目的                   | 女性ホルモンの一種であるE2と下垂体から分泌され、血中の女性ホルモン濃度を調整しているFSHの2種類を測定します。更年期が気になる方におすすめです。 |
| 検査方法                 | 採血                                                                         |
| ご注意                  | 閉経（1年間生理がない状態）していない方が対象です。                                                 |

| 子宮頸がん検診 4400円 |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 目的            | 子宮頸部にがんがないかを調べます。20歳以上の方におすすめです。                                 |
| 検査方法          | 子宮の入り口にある子宮頸部の細胞を綿棒、ブラシ等で擦り、採取し、がんがないかを調べます。内診も行います。             |
| ご注意           | 生理日だと出血の影響で細胞が十分に採取できない可能性がありますので、検査を生理日以外の日に、調整していただくことをお勧めします。 |

| HPV検査 6600円<br>子宮がん検診を受けていただいた方のオプションとさせていただきます |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的                                              | 子宮頸がんに関連があるとされている、HPVウイルスの感染があるかどうかを調べます。30歳以上の方におすすめです。細胞診とHPV検査を併用することでがんの見逃しをほぼ0に近づけることができます。また、細胞診もHPV検査も陰性であった場合、次の検診は3年後で良いと推奨されています。 |
| 検査方法                                            | 子宮がん検診の時に一緒に検体を採取します。                                                                                                                       |

| クラミジア検査 4400円<br>子宮がん検診を受けていただいた方のオプションとさせていただきます |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的                                                | 性感染症の中で一番多いクラミジアは、女性の7～8割が自覚症状がなく、気がつきにくい病気です。放置すると、卵管炎・腹膜炎・子宮外妊娠・不妊症の原因になることもあります。性感染症が気になる方や妊娠前のチェックにおすすめです。 |
| 検査方法                                              | 子宮がん検診の時に一緒に検体を採取します。                                                                                          |

| 乳がん検診（2種類）                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的                         | 乳腺にがんがないかを調べます。                                                                                                                                                                                                         |
| 乳腺超音波検査 3850円              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 検査方法                       | 乳腺密度の高い乳房に有効です。手に触れない小さなしこりも発見しやすい検査です。<br>乳房にゼリーをぬり、機械を当てながら検査を行います。                                                                                                                                                   |
| ご注意                        | 妊娠中・授乳中の方も受けられますが、乳腺の厚みが増すため、検診精度が落ちる可能性があります。断乳後の検査をおすすめします。                                                                                                                                                           |
| マンモグラフィー（3D トモシンセシス） 9350円 |                                                                                                                                                                                                                         |
| 検査方法                       | 超音波検査で発見しにくいがんのサインである微細石灰化を鮮明に映し出します。乳房を2枚の板に挟み、レントゲン写真を撮影します。1回の撮影で20～80枚の画像が得られます。2Dでは重なって診断しにくかった部分が見やすくなります。                                                                                                        |
| ご注意                        | 以下の項目に該当する方はマンモグラフィーをお受けできません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・心臓ペースメーカーを装着されている方。</li> <li>・豊胸術を行っている方。</li> <li>・妊娠している、または可能性のある方。</li> <li>・1年以内に肋骨骨折、頸椎損傷、開胸手術をされている方。</li> <li>・授乳中、断乳3ヶ月以内の方。</li> </ul> |
| 備考                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・当院での乳がん検診は、早期発見のため、超音波とマンモグラフィーの両方の検査を毎年受けることをお勧めしています。</li> <li>・乳がんの既往がある方で、現在通院治療されていない方にもおすすめします。</li> </ul>                                                                |